

# UNE RÉACTION PENDANT OU JUSTE APRÈS AVOIR MANGÉ

## J'ÉVALUE IMMÉDIATEMENT LA GRAVITÉ DE LA RÉACTION



### RÉACTION GRAVE ?

- Ma voix change
- Je respire mal, je siffle
  - Je tousse
- J'ai très mal au ventre
  - Et je vomis
- Mes mains, mes pieds et ma tête me démangent
  - Je me sens bizarre
  - Je fais un malaise
  - Autres signes :

#### **ATTENTION !**

*Cela peut être grave et encore plus si plusieurs de ces signes sont associés*



### LES BONS RÉFLEXES

1. Allonger l'enfant
2. **INJECTER** .....  
dans la face antéro-externe de la cuisse
3. **PUIS** APPELER LE SAMU (15, 112)
4. si gêne respiratoire, mettre en position ½ assise et inhaler .....bouffées de ...../prise selon la gêne (en chambre d'inhalation) qui peuvent être renouvelées toutes les.....minutes
4. En attendant les secours, si les symptômes persistent, une 2<sup>ème</sup> injection de .....  
peut être réalisée après 5 minutes ou plus
5. des corticoïdes peuvent être donnés.....



### RÉACTION LÉGÈRE ?

- Ma bouche pique ou gratte
  - Mon nez coule
  - Mes yeux piquent
  - Mes lèvres gonflent
- J'ai des plaques rouges qui grattent
  - J'ai un peu mal au ventre
  - Et j'ai envie de vomir
  - Autres signes :

**MAIS JE PARLE  
et RESPIRE BIEN**



### LES BONS RÉFLEXES

- 1 Antihistaminique :
- 2 Corticoïdes :
- 3-Surveiller l'enfant jusqu'à disparition des symptômes
- 4-Prévenir les parents
- 5-Prévoir une consultation médicale

### EN L'ABSENCE D'AMELIORATION

